Las Serpientes Venenosas del Sureste de los EEUU

Víbora cabeza de cobre
Agkistrodon contortrix

Venenosa

Tamaño: Serpiente de tamaño mediano, generalmente mide de 60 a 80 cm de largo
Descripción: Cuerpo de color pardo claro o grisáceo con bandas oscuras transversales en forma de mariposas; franja facial indistinta; juveniles con la punta de la cola amarilla
Hábitat: Tierras bajas cercanas a los ríos, arroyos y pantanos
Detalle interesante: Este experto en camouflage puede ser casi invisible sobre la hojarasca



Mocasín de agua o Boca de algodón
(Cantil)
Agkistrodon piscivorus

juvenile

Venenosa

Tamaño: Serpiente de tamaño mediano a grande, generalmente mide de 60 cm a 1,2 m de largo
Descripción: Cuerpos de juveniles son de color pardo rozijo brillante con bandas transversales y franjas faciales prominentes; juveniles con la punta de la cola amarilla ; las marcas se borran según laedad – muchos adultos son de color pardo oliváceo o negro uniforme; muchas veces son confundidos con las inofensivas culebras de agua
Hábitat: Márgenes de los lagos, canales y pantanos
Detalle interesante: La víbora boca de algodón, cuando se siente amenazada, en defensa se muestra el interior de la boca que es blanco como algodón.



Venenosa

Para identificar las serpientes-coralillos, se acuerde a los semáforos de tránsito "¡amarillo, rojo, PARE!" Los anillos amarillos y rojos de las serpientes-coralillos son en contactos.

Serpientes-coralillos o Corales
Micrurus fulvius & Micrurus tener

Tamaño: Serpiente delgada de tamaño mediano, generalmente mide alrededor de 60 cm de largo
Descripción: Hay dos especies bien similares – la serpiente-coralillo arlequín y la coralillo texana (ver el mapa). Rostros negros; cola con anillos negros y amarillos; cuerpo con anillos rojos, amarillos y negros – los rojos siempre en contacto con los amarillos
Hábitat: Vive bajo la tierra, troncos o maleza/broza en una variedad de hábitats naturales, a veces se encuentra en áreas suburbanos
Detalle interesante: Las serpientes-coralillos son las únicas serpientes venenosas en los EEUU que ponen huevos - las pequeñas de las otras nacen vivas y desarolladas.



Inofensiva

Culebra de agua norteña
Nerodia sipedon

Inofensiva

Culebra de agua fajeada
Nerodia fasciata

Culebra de agua parda
Nerodia taxispilota

Inofensiva

Culebra verde de agua florideña
Nerodia floridana

Inofensiva

¡Todas las serpientes acuáticas no son mocasínes! Varias especies inofensivas llamadas 'Culebra de agua' son parecidas a 'la boca de algodón'.

Inofensiva

Serpiente escarlata
Cemophora coccinea

Inofensiva

Falsa coral o Serpiente real escarlata
Lampropeltis triangulum

Dos especies en el sureste del país tienen anillos de colores parecidos a las corales. En contraste con las serpientes-coralillos, estas falsas corales tienen rostros rojos y los anillos rojos y amarillos (o blancos) no son en contactos.

Cascabel pigmeo
Sistrurus miliarius

Venenosa

Tamaño: Serpiente pequeño, generalmente mide de 30 a 45 cm de largo
Descripción: Cuerpo de color de café o gris claro (puede ser gris rosado o bien oscuro – ver el imagén pequeño); manchas oscuras por el lomo y los lados del cuerpo; linea punteada rozija por el espinazo entre las manchas; franja facial oscura; cascabel pequeño; juveniles con punta de la cola amarilla.
Hábitat: Principalmente en bosques (pino, roble o palma); se encuentra con frecuencia en áreas suburbanos
Detalle interesante: El cascabel pequeño de estas serpientes genere solamente un sonido como un zumbido suave.

Crótalo de bosque o Víbora de cascabel fajeada
Crotalus horridus

Venenosa

Tamaño: Serpiente de gran tamaño, generalmente mide de 1,0 a 1,5 m de largo
Descripción: Cuerpo de color pardo-amarillo (a veces rosado), café, grís o negro con bandas oscuras transversales en forma de "V" por el lomo; linea punteada rozija por el espinazo entre las bandas; cascabel grande; franja facial oscura
Hábitat: Bosques densas (madera dura o pino), matorrales de caña, tierras bajas, terreno montañoso
Detalle interesante: Se encuentra a esta serpiente muy raramente en áreas suburbanos.



Cascabel o Crótalo diamantino oriental
Crotalus adamanteus

Tamaño: Serpiente grande, generalmente mide de 1,0 a 2,0 m de largo
Descripción: Cuerpo de color café o gris con diamantes oscuros bordados de blanco-amarillo por el lomo; franja facial oscura y prominente, bordada de franjas claras; cascabel grande
Hábitat: Bosques áridos de palmitos o pinos, se encuentra raramente en áreas suburbanos (a veces en las canchas de golf)
Detalle interesante: El veneno de esta serpiente es entre los más tóxico de todas las serpientes de los EEUU.

Venenosa

¡Un teléfono celular es el mejor equipo de primeros auxilios!

Víboras de cascabel y otras 'víboras de foseta'



No se toque ni se acerque a una serpiente venenosa – viva o "muerta" – – para verificar estas características.

Como responder a una mordedura de serpiente venenosa…

¡SE DEBE!
- ¡Llamar a 911 – ¡Busque atención médica inmediatamente!
- Alejarse a la víctima de la serpiente
- Hacer que la extremidad mordida (brazo, pierna, dedo) es más baja que el nivel del corazón
- Mantener a la víctima caliente y calmada
- Quitar los brazaletes, anillos, relojes y otros artículos de vestir que restrinja la extremidad mordida

¡NO SE DEBE!
- ¡No se debe esperar hasta que los síntomas se aparecen para buscar atención medica!
- No se debe intentar capturar o matar la serpiente para identificarla
- No se debe aplicar torniquetes a la extremidad mordida
- No se debe hacer cortes para succionar el veneno
- No se debe poner hielo o calor sobre la herida
- No se debe tocar a la serpiente venenosa "muerta"

Serpientes inofensivas y Serpientes-coralillos



Cuando se sienten amenazadas, unos serpientes inofensivas se aplanan la cabeza, hasta que pareces bien ancha.

UF IFAS Extension UNIVERSITY of FLORIDA
USDA
Concepto: Steve A. Johnson, Ph.D. y Monica E. McGarrity; Diseño y ilustraciónes: Dale A. Johnson, www.dalejohnsonsart.com
Patrocinada por la Universidad de la Florida/IFAS y el Departmento de la agricultura de los EEUU, 'Renewable Resource Extension Act'
Para copias adicionales, por favor contacte al Dr. Steve A. Johnson -- tadpole@ufl.edu